

# かぜ

の諸症状の緩和

鼻水 ねづ  
のどの痛み



かぜは早めのお手当を!

「かぜの養生訓」

- 早めに症状にあったかぜ薬をのみましょう。
- 水分(水、お茶、果汁等)を充分にとりましょう。
- 安静にし睡眠を充分にとりましょう。
- 食事は栄養価の高い消化の良いものにとりましょう。

生薬成分+新薬成分の効き目をバランスよく配合したかぜ薬です。

## カイゲン顆粒

<2g×8包>

### 効能

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

### 用法・用量

つぎの1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用。

《1回量》

- 15才以上 .....1包
- 11才以上~15才未満 .....2/3包
- 8才以上~11才未満 .....1/2包
- 5才以上~8才未満 .....1/3包
- 3才以上~5才未満 .....1/4包

### 配合成分

成分	1日量(3包)6g中	主な働き
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげる。
ノスカピン	30mg	せきの中枢に働いて、せきをしずめる。
dl-塩酸メチルエフェドリン	30mg	気管支をひろげ、せきをしずめる。
マレイン酸クロルフェニラミン	7.5mg	かぜの初期にみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみのアレルギー症状をやわらげる。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげる。
カンゾウ末	750mg	せきをしずめ、たんを出しやすくし、かぜの回復を助ける。
キキョウ末	1,000mg	たんをうすめ、出しやすくし、かぜの回復を助ける。
ケイヒ末	500mg	頭痛をやわらげ、熱を下げ、かぜの回復を助ける。

### 注意

1.次の人は服用しないでください。(1)本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。3.服用に際しては、説明文書をよくお読みください。4.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。5.小児の手の届かない所に保管してください。6.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

この医薬品は、「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いください。特にアレルギー体質の方は服用前に医師や薬剤師等にご相談ください。



